

う。ここ10年で発症者数が増加し、その数は今や400万人近くにものぼるという脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなつた結果、内部の神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こす病気です。この状態では、手術をしなくても治療方法も異なるので、習慣の見直しで改善することができる。しかし、このままではますます悪化していく可能性があります。

痛み以外にいくつも
存在する

脊柱管狭窄症の予兆



人間の体を木に例えると、太い神経が集まっている脊柱管は、そこから腰や手足へ向かって広がるようになります。脊柱管狭窄症は、この部分が圧迫される

善するタイプ手術しなければ重症化するタイプ、どちらにせよ早期発見が大原則だまずは自分のタイプを知ろう

枝分かれしていく神経の根元が圧迫され、右側に左のどちらかに痺れや強い痛みが現れる。比較的治療しやすい、外科的手術を行わない保存療法で改善する可能性あり。

『混合型』

神經根型と馬尾型を併合した型で、抱えきる症状も両方に当てはまる。

馬尾型と並び保存療



馬尾東ごと呼はれる神経症は左側に迫れる
便進り神經に出る痺などはしされ
神に行き障害するが脇胱が特徴は右側にびれ
経根型が出現すると排いやは直腸両側に側れて
便進り神經が出る痺などはしされ
神に行き障害するが脇胱が特徴は右側にびれ
経根型が出現すると排いやは直腸両側に側れて

脊柱管狭窄症の子孫は、痛み以外にいくつも存在する。どれも些細なサインで、「加齢によるものか」と見過ごす人が多いが、脊柱管狭窄症を発症し、いつしか動く力が削がれてしまふうに当てはまる自分がないか、ここ



② 慢速で歩くと、
③ たれたりする距離が短くなつて、
④ 移動は問題ない□
⑤ じつと立つていろ
⑥ や⑦ ただけでも下半身が痩れてくる□
⑦ ⑤の感覚で悩んでいる
⑧ 尿便が漏れそうになることがある□

初期症状サイン

かつ日どてに多のび圧結脊い症高
？け常だい1く病れ迫果柱る者齢
る生る人、気をさ、管脊が者
べ活と以70は引れ内が柱管狭窄症
きこわがで上代高齢起痛みがた
とにわがで者こすやがた
とはれ発は症10にも
何をるほし入こす
何をるほし入こす



⑧低気圧で天気が崩れる時、体調が悪くなる。⑨靴下を履く姿勢が苦手。⑩足の皮膚感覚に違和感がある。⑪尻を後ろに突き出して歩くようになつた。□チエックが3つ以上で危険度高い。脊柱管狭窄症からくる。

脊柱管狭窄症を発症するときには、自分がつまらうとする「負のスパイラル」にハマつてしまいます。これは、抑制物質を抑制する「ストレス」となり、「痛み」として現れるのです。

る、痛みは気分を左右されし、気分に左右されし、

診療科目：腰痛、膝痛、首肩痛、五十肩、神経痛、頭痛など

りの気分転換で心の状態の改善に努めることが必要だ

【1】～【3】の流れ

【1】しびれと痛み

【2】脳から出るはずの痛みを抑える成分が制限

【3】しびれや痛みがより強く感じられる

脊柱管狭窄症の人が多い理由

また、脊柱管狭窄症と関係が深いとされる心の病気について

痛みが続き、体を思うように動かせない

ストレスでは、誰もが憂鬱な気分になる

何事も楽が落ちない

「疲れ」、「眠れなくなってしまった」といった心の病気

「疲れ」「眠れなくなってしまった」といった心の病気

【1】～【3】の流れ

【1】しびれと痛み

【2】脳から出るはずの痛みを抑える成分が制限

【3】しびれや痛みがより強く感じられる

脊柱管狭窄症の人が多い理由

また、脊柱管狭窄症と関係が深いとされる心の病気について

痛みが続き、体を思うように動かせない

ストレスでは、誰もが憂鬱な気分になる

何事も楽が落ちない

「疲れ」「眠れなくなってしまった」といった心の病気

万が一脊柱管狭窄症がうつでは痛みの原因がないにもかかわらず痛みを感じる症状が出てくることもやしひれがあつても、笑顔の時間は作りたい「ストレス軽減は、自分が感じている痛みを軽くしてくれると」知り、好みのストレス解消法を探そうとすれば、「冷えでの痛みの誘発を防ぐ生で温活めのお風呂長めの時間を作ることでセルフメンテナンス」などが有効だしばらく痛みとお付き合いせざるを得ない人たちに推奨されるのが「痛み日記」を感じた痛みを10段階の数字で記録していく「痛み日記」をつける

化に10級0痛く、のみ手の法など想定し、「我が人生最大を感しはじめて記録され、その日を最大にした。どのタイプの痛みを数値で評価しますか？」と問われます。この質問に対する回答が、腱板断裂（腱板）

参考 痛み・四・五十肩 になる本当の原因

Q は 何 で す か? ど う い う 人 が な り や す い す か?

ス ポ ー ツ や 仕 事 で の 酷 使 な ら が 原 因 と な る こ と が 多 い で す。

特 に 腕 や 手 を 頭 よ り も 高 い 位 置 に 挙 げ て り 繰 り 返 し 作 業 を す す る 仕 事 や ス ポ ー ツ を す す る 人 に 多 く 見 ら れ ま す。

塗 装 業 や 大 工 さ ん 、 テ ニ ス ポ ー ツ だ と 野 球 や ま た 、 加 齢 に よ つ て も 切 れ や す く な つ て ま い ま す。

・ 髪 の 毛 に 触 れ た り、 背 中 を 触 つ た り す ご と き な く な る

・ 上 腕 の 筋 力 低 下 を 伴 い、 繰 り 反 し 運 動 を し て い る と だ る が 挙 げ ら れ ま す。

今 す ぐ 読 み た い 一 腕 が あ が ら な い ほ ど の

肩40歳以上との男性で右半数が断裂している報告もあります。1／4が、70歳ではいう報告もありました。



MR-Iによる腱板断裂の程度を分類した分類した範囲による腱板断裂の類度があり、手術方針選択につかわれます。やQ..腱板断裂はどうして診断しますか？M-R-Iは必要ですか？問診と身体所見、およびMR-Iまたは超音波の画像評価で診断します。身体所見としては、お身に圧痛点の有無を確認したり、複数の方に向かっての筋力を測定したりします。また一定の角度で痛みが生じるかを確認するペインフルアックサインといつた身体所見を評価します。次月に続く



ホームページQRコード アクセスしてみてね